

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

腎臟及泌尿系統：血尿、少尿、尿失禁、腎功能損害：

【禁忌】

2. 高血压患者、急性心脏病者、正常血容量及高血容量的心力衰竭患者。
3. 严重贫血患者。
4. 肾功能不全者。

1.药液呈现浑浊、沉淀、异物或瓶子有裂纹、瓶盖松动、过期失效等情况不可使用。

不難看出，雖然在 1990 年以前，中國政府對「三民主義」的宣傳，

4. 有喉痛脫水者或國計補液

5. 运输及贮存过程中严禁冻结

【孕妇及哺乳期妇女用药】

对孕妇或可能怀孕妇女的用药应慎重,如有必要应用时,应在医师指导和严密观察下使用。

【川龍馬路】

尚不明确。

【老年用药】

尚不明确。

1. 药物相互作用

本品不宜与血管收缩药、蛋白水解酶或含酒精溶剂的注射液混合使用。

【药物过量】

因本品有溶血作用, 过量注射时, 可造成溶血, 机体循环负荷增加, 充血性心力衰竭和肺水肿。

【药理毒理】

药理作用: 1.增加水容量来维持正常的渗透压:白蛋白占血浆胶体渗透压的80%,主要调节组织与血管

[illegible]

1000

◎ 俗文化語彙 · 1

[illegible]

廣州研究：高玉傑

麻理研究: 簡・亞學識

【药代动力学】

尚不明確

【贮藏及运输】

2. 室温(10~30℃)避光保存和运输,也可在2~8℃运输。

1992

中國玻璃模制注射劑瓶、注射應用氯化丁基橡膠塞(強化): 1瓶/盒

【有效期】

36个月

【执行标准】

《中国药典》2020年版三部和YBS00542012

【批准文号】

国药准字S20023010

【药品上市许可持有人】

博晖生物制药(河北)有限公司

【生产企业】

企业名称:博晖生物制药(河北)有限公司

生产地址:石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区曹山路6号

郵政編碼:050200

电话号码:0311-83935518

传真号码:0311-83935513